

	生ワクチン	不活化ワクチン
接種方法	皮下注射	筋肉注射
費用	約6000円～8,000円	約 20,000～30,000 円／回
接種回数	1回	2回 (1回目の接種から2か月の間隔を置いて 2 回目を接種 (6か月後までに接種))
主な副反応 (添付文書より)	★頻度10%以上の副反応 発赤 (44.0%) かゆみ (27.4%) 熱感 (18.5%) 腫脹 (17.0%) 疼痛 (14.7%) 硬結 (13.5%) ★重大な副反応 (いずれも頻度不明) アナフィラキシー、無菌性髄膜炎、 血小板減少性紫斑病	★頻度10%以上の副反応 疼痛 (79.1%) 発赤 (37.4%) 筋肉痛 (36.9%) 疲労 (34.6%) 頭痛 (28.3%) 腫脹 (24.2%) 悪寒 (21.4%) 発熱 (16.7%) 胃腸症状 (12.0%) ★重大な副反応 (いずれも頻度不明) ショック、アナフィラキシー
発症予防効果	50～59 歳 : 69.8%※ 60～69 歳 : 64% 70～79 歳 : 41% 80 歳以上 : 18% 【引用文献】 ZOSTAVAXによる試験結果 (※50 歳代は ZEST 試験)	50～59 歳 : 96.6% 60～69 歳 : 97.4% 70 歳以上 : 97.9% 【引用文献】 ZOSTER-006試験
持続性	約5年間 【引用文献】 ZOSTAVAXによる試験結果	9.6年後まで確認 (今後15年目まで確認予 定) 【引用文献】 ZOSTER-049試験
注意点	！！要注意！！ 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する 人や、免疫抑制をきたす治療を受けている人 は接種できません。	2 回の接種が必要です。標準的には 1 回目の 接種から 2 か月後に 2 回目を接種します。2 か月を超えた場合、6 か月後までに接種を受 けてください。 ※ 6 か月を超えての接種は、助成対象となり ません。